




THE
ANTI-CRUELTY
SOCIETY



Your Pet's Post-Surgical Care

PAIN MEDICATION:

A note about medication: A long-lasting injection of pain medication is given at the time of surgery. Additional pain medications are generally not necessary. If your pet experiences discomfort during the days following surgery, please call the clinic at 312-645-8051 or 312-645-8052

CARE INSTRUCTIONS:

Limit activity for 10 days post-surgery.

Mild exercise such as walking is allowed. Limit your pet from running as much as possible.

Your pet may be slightly unsteady or groggy tonight. This is normal after anesthesia.

Provide your pet with a bowl of water when you arrive home. If no vomiting occurs after $\frac{1}{2}$ hour, you can give $\frac{1}{4}$ to $\frac{1}{2}$ of their usual evening meal.

If vomiting occurs after giving water, wait a couple of hours before giving $\frac{1}{4}$ to $\frac{1}{2}$ of their usual meal.

Water should be available throughout the evening.

Resume normal feeding the next day if no vomiting has occurred.

Dogs and female cats have internal sutures that provide strength to the tissue as they heal. Strenuous activity such as running and jumping could disrupt the healing process and lead to complications.

The incision area was closed with surgical skin glue; therefore, no stitches will need to be removed.

Do not allow your pet to chew or lick the incision. If you notice excessive licking, you may need to purchase an E-collar/cone at your local pet supply store. Male cats do not generally require an E-collar.

Check the incision daily for swelling, discharge, or opening at the incision site.

Do not bathe or use flea powder for the next 10 days.


CONTACT THE CLINIC IF YOU NOTICE ANY OF THE FOLLOWING:

- Persistent vomiting and/or diarrhea
- Lethargy
- Poor appetite (lasting more than 24 hours after surgery)
- Swelling, discharge, bleeding, or opening of the incision site

Complimentary post-operative care will be provided until the incision heals. However, you must call the Society's clinic to schedule an appointment.

Contact the clinic at 312-645-8051,
Monday–Sunday, 9 a.m.–5 p.m.

On holidays, 9 a.m.–6 p.m.,
call 312-644-8338, ext. 0 to speak
to an operator



El Cuidado Posquirúrgico de tu Mascota

MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR:

Al momento de la cirugía se administra una inyección de medicamento para el dolor de larga duración. Los analgésicos adicionales generalmente no son necesarios. Si su mascota experimenta molestias durante los días posteriores a la cirugía, por favor llame a la clínica al 312-645-8051 o al 312-645-8052.

CARE OF INSTRUCTIONS:

Límite la actividad durante 10 días después de cirugía.

Ejercicio leve como caminar es permitido.

Límite a su mascota a correr cuanto más pueda.

Su mascota puede estar un poco inestable esta noche. Esto es normal después de la anestesia.

Dale a su mascota un recipiente con agua cuando llegue a casa. Si su mascota no vomita en la próxima media hora, puede darle de comer la mitad de los alimentos que usualmente come.

Si su mascota produce vómito después del agua, espere un par de horas antes de dar la mitad de los alimentos que usualmente come.

El agua debe de estar disponible durante toda la noche.

Reanude la alimentación normal al día siguiente si no ha producido vómito.

Los perros y las gatas tienen suturas internas que proporcionan fuerza al tejido mientras cicatriza. Actividades extenuantes como saltar o correr podrían interrumpir el proceso de curación y producir complicaciones.

El área de la incisión fue cerrada con pegamento para la piel quirúrgico; por lo tanto no será necesario quitar puntos.

No permita que su mascota muerda o lame la incisión. Si nota lamido excesivo puede que necesite comprar un cono en cualquier tienda de mascotas. Los gatos machos, generalmente no necesitan el cono.

Revise la incisión diariamente para ver si no hay hinchazón, secreción, o apertura en el sitio de la incisión.

No bañe ni use ningún tratamiento anti-pulgas en los próximos 10 días.

CONTACTE A LA CLÍNICA SI NOTA ALGUNO DE LO SIGUIENTE:

- Vómito y/o diarrea persistente.
- Adormecimiento/insensibilidad
- Falta de apetito (que dure mas de 24 horas después de cirugía)
- Hinchazón, secreción, sangrado o apertura de la incisión.

Cuidado postoperatorio de cortesía será proporcionada hasta que la incisión cicatrice. Sin embargo, debe llamar a la clínica de The Anti-Cruelty Society para programar una cita.

Para cancelar o reprogramar la cita, comuníquese con la clínica al número 312-645-8051, de Lunes a Domingo 9 a.m.-5p.m.

Días festivos, 9 a.m.-6 p.m., llame al 312-644-8338, ext 0 para hablar con un operador.